

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 140 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 000 28 D



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 19 - 24 juin 1987

COLZA : Application fongicide . . . si dégâts dus à la grêle

POIS

Botrytis : Fongicide dès que possible

Tordeuse : Localement, traitement à réaliser

TOURNESOL

Puceron : Traitement souvent justifié

SUR MINITEL

Vous pourrez aussi consulter
les Avertissements Agricoles du S.R.P.V.
Bourgogne



Pour obtenir les Avertissements télématiques

APPELEZ le 36-15

CODE EDIMK

P O I S**MALADIES****SITUATION :**

Très forte évolution du Botrytis depuis une semaine. Les niveaux les plus attaqués sont souvent ceux qui ont fleuri pendant la période pluvieuse : à la suite des conditions très humides les pétales sont restés collés sur les jeunes gousses en formation.

PRECONISATION :

Un traitement est à réaliser dès que possible selon les conditions météorologiques et la possibilité de pénétrer dans les parcelles.

Utiliser des spécialités efficaces sur Botrytis : celles indiquées en vert foncé dans le dépliant jaune, cultures protéagineuses ITCF-FNAMS-SPV-INRA : Céréclair - Bravo plus 2 l/ha - B.T.F. 3,5 l/ha - Folgan 3 kg/ha.

TORDEUSE

SITUATION : De nouvelles captures uniquement à Binges (21) : 145 tordeuses.

PRECONISATION :

YONNE : Secteur de Champlost

COTE-D'OR : Secteur Époisses et Binges

NIEVRE : Secteur de Donzy, un traitement a été conseillé dans la période du 10 au 15/6

A réaliser ou à renouveler.

} Traitement à prévoir

PUCERON

SITUATION : Dans l'ensemble peu fréquent, mais localement ils peuvent être observés.

PRECONISATION :

Le seuil d'intervention est élevé de l'ordre de 30 pucerons/plante.

Spécialités utilisables : Pirimor 0,5 kg/ha ou Azofène - Zolone à 1,4 l/ha. Ces deux spécialités sont efficaces sur tordeuse et puceron.

P.1.34

PUCERON**SITUATION :**

- . L'étalement et l'hétérogénéité des stades se maintiennent.
 - les parcelles les plus en avance ont 70 à 90 cm de haut, et le bouton floral a 3-4 cm de diamètre.
 - les parcelles les plus en retard ont 40 cm de haut ; elles atteindront le stade bouton étoilé dans le courant de la semaine prochaine.
- . **Confirmation de la présence fréquente de pucerons et de la progression des populations**
Des niveaux de 60-80 pucerons/plante sont souvent notés en culture.

PRECONISATION :

Des interventions insecticides sont justifiées dans les situations où les populations actuelles sont de 60-80 pucerons/plante.

- les réaliser dès que possible
- dans les parcelles en avance, ces traitements ne pourront être faits avec le matériel de l'agriculture : nécessité d'utiliser un enjambeur ou de le faire par voie aérienne
- Spécialités utilisables : Serk 1,5 l/ha - Pirimor 0,250 à 0,500 kg/ha, si les interventions ont lieu sur des niveaux importants de population.

SCLEROTINIA : POURRITURE DE FEUILLES ET CAPITULES**SITUATION :**

- . Depuis la semaine dernière la fréquence de pieds attaqués sur feuilles et (ou) bourgeon terminal ne progresse plus.
- . Les niveaux d'attaque sont variables selon les parcelles : si des attaques très importantes sont parfois notées sur bourgeon terminal, dans l'ensemble ce type de situation est peu fréquent.

PRECONISATION : Ne pas envisager de traitement fongicide.

M A I S

STADES : Pour la plupart autour du stade 8 feuilles avec certaines situations avancées atteignant 10 feuilles et des situations moins avancées encore à 4-5 feuilles.

Les cultures restent souvent marquées par les conditions de végétation peu favorables.

PUCERONS : De faibles infestations sont parfois notées, essentiellement de *Métopolophium dirhodum*. Aucune intervention ne se justifie actuellement.

PYRALE : Les premières captures ont été observées depuis la fin de la semaine dernière (Saône-et-Loire, Jura, Haute-Saône, Côte-d'Or, Yonne). Les périodes d'intervention seront précisées ultérieurement.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIU DE LA POMME-DE-TERRE**SITUATION - PRECONISATION :**

Les risques de contaminations ont été élevés au cours de la semaine dernière. Il est indispensable d'assurer une couverture fongicide soignée contre le Mildiou. Utiliser un produit pénétrant ou systémique.

MILDIU DE L'OIGNON**SITUATION - PRECONISATION :**

Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de la maladie ; la protection doit être poursuivie.